

dus akademisi.com

2026 DUS 2. DÖNEM

ÇIKMIŞ SORU REFERANS RAPORU

Anatomi

DUS Anatomi Konu Kitabı · 87 sayfa

YAZAR

Uzm. Dr. Tamer ÇELİK

6/6
Anatomi sorusu

6
Toplam referans

DUS'ta Anatomi sorusu: 6

Konu Kitabı: 6/6 Anatomi soruya referans

Referans Haritası

DUS Anatomi Konu Kitabı · **6/6 Anatomi**

Soru	Branş	Konu	Sayfa
TEMEL 1	Anatomi	Solunum Sistemi · Akciğerler	**50**
TEMEL 2	Anatomi	Sindirim Sistemi · Glandula Submandibularis	**30**
TEMEL 3	Anatomi	Nöroanatomi ve Duyu · Göz Kasları	**76**
TEMEL 4	Anatomi	Kemikler · Cavitas Nasi Duvarları	**15**
TEMEL 5	Anatomi	Nöroanatomi · Beynin Bölümleri	**54**
TEMEL 6	Anatomi	Nöroanatomi · N. Trigeminus	**77**

SORUNUN ÖZÜ

Sol akciğer üst lobuna ait yapılar

ANAHTAR KELİME

lingula pulmonis

DOĞRU CEVAP

✓ **Lig. pulmonale üst loba ait bir yapı değildir**

BİLGİ

Sol akciğer fissura obliqua ile iki loba ayrılır; **lingula pulmonis** sinistri üst lobdadır.




KİTAPTAKİ KARŞILIĞI

DUS Anatomi Konu Kitabı

Sayfa 50

! Kalp ve özofagus her iki akciğer de iz yapar[T]

Sağ akciğer üzerinde[T]	Sol akciğer üzerinde
✓ V. cava superior	✓ Arcus aorta
✓ V. cava inferior	
✓ V. azygos	
✓ V. subclavia dextra	✓ A. subclavia sinistra[T]
✓ V. brachiocephalica dextra'nın izi vardır.	✓ V. brachiocephalica sinistra'nın izi vardır.



Radix Pulmonis

✓ Sol akciğer üst lobda lingula pulmonis sinistri[T] isimli yapı bulunur.
✓ Radix pulmonis[T] içerisinde önden arkaya → V. pulmonalis | A. pulmonalis | Bronchus principalis | A.v. bronchialis

SORUNUN ÖZÜ

Ductus submandibularis'in sinir komşuluğu

ANAHTAR KELİME

Ductus submandibularis'te taş

DOĞRU CEVAP

✓ **N. lingualis**

BİLGİ

Wharton kanalı n. hypoglossus ile **n. lingualis** arasından geçer; **n. lingualis** kanalı dıştan çaprazlar.



KİTAPTAKİ KARŞILIĞI

DUS Anatomi Konu Kitabı

Sayfa 30


En çok salgı üreten tükürük bezidir. (Siyalolitiyazis en sık)

M. mylohyoideus[D] (ağız döşemesi) tarafından ikiye ayrılır. (Ataş gibi tutunur)

📌 Ductus submandibularis (Wharton); n. hypoglosus ile n. lingualis arasından geçer.[T]
📌 N. lingualis tarafından dıştan çaprazlanır.

❗ A. facialis,[D] dış yüz arka üst bölümünden;
❗ V. facialis,[T] alt yüzün üzerinden geçer.

✅ Gl. submandibularis ve Gl. sublingualis'in parasempatik innervasyonu → N. facialis'in chorda tympani dalı
✅ Chorda tympani → N. lingualis'in içerisinde taşınır.[D]



SORUNUN ÖZÜ

Göz kası ve hareketleri

ANAHTAR KELİME

Elevasyon

DOĞRU CEVAP

✓ **M. rectus superior - Elevasyon**

BİLGİ

M. obliquus superior – İntorsiyon
M. obliquus inferior – Ekstorsiyon



KİTAPTAKİ KARŞILIĞI


DUS Anatomi Konu Kitabı

Sayfa 76


Lezyonu

- İntranuclear lezyon → Kontralateral bulgu
- İnfranuclear lezyon → İpsilateral bulgu
- ! Çekirdek sonrası çapraz yapan tek kraniyal sinir

✓ M. obliquus çalışmaz. Göz aşağı dışa bakamaz.
✓ Vertikal diplopi olur.
✓ Gözün aşağı dışa baktığı merdiven inme kitap okuma durumlarında hasta zorlanır.



① M. rectus superior
② M. levator palpebrae superior
③ M. rectus medialis
④ M. rectus inferior
⑤ M. obliquus inferior
⑥ M. obliquus superior
⑦ M. rectus lateralis



N. oculomotorius N. trochlearis N. abducens

SORUNUN ÖZÜ

Cavitas nasi dış duvarını oluşturan kemikler

ANAHTAR KELİME

lamina perpendicularis

DOĞRU CEVAP

✓ **Ethmoid lamina perpendicularis (septumda)**

BİLGİ

Septum nasi: Os ethmoidale lamina perpendicularis, Vomer
Maxilla ve palatinum'un crista nasalis'leri



KİTAPTAKİ KARŞILIĞI

DUS Anatomi Konu Kitabı

Sayfa 15

📌 Alt Duvar
Maxilla (Proc. palatinus) ve os palatinum (lamina horizontalis)

📌 Üst Duvar (NeFES)
Nasal, Frontal, Ethmoidale ve Sphenoidale

📌 Dış Duvar
Concha nasalis superior, media, inferior
Maxilla, nasal, lacrimal
Palatinum'un lamina perpendicularis'i
Sphenoidale'nin proc. pterygoideus'unun lamina medialis'i

📌 İç Duvar (Septum nasi)
Ethmoidale'nin lamina perpendicularis'i,
Vomer
Maxilla ve palatinum'un crista nasalis'leri
Frontal, sphenoid, nasal kemikler ve cartilago septi nasi oluşturur.



SORUNUN ÖZÜ

Cerebrum tanımına giren beyin bölümleri

ANAHTAR KELİME

Cerebrum

DOĞRU CEVAP

✓ **Telencephalon ve diencephalon**

BİLGİ

Telencephalon iki hemisferi, diencephalon thalamus, hypothalamus, subthalamus ve epithalamusu kapsar.



KİTAPTAKİ KARŞILIĞI

DUS Anatomi Konu Kitabı

Sayfa 54

dus akademisi


BÖLÜM 4
Nöroanatomi

A-) GİRİŞ VE MEDULLA SPİNALİS

Sinir Sistemine Giriş

SSS
✓ Santral sinir sistemi kemik yapılar tarafından korunur. (Beyin ve medulla spinalis)

Gelişimi
✓ Telencephalon → İki hemispherium cerebri
✓ Diencephalon → Thalamus, hypothalamus, subthalamus ve epithalamus
✓ Mesencephalon / Pons / Bulbus
✓ Cerebellum



- Prosencephalon → Telencephalon + diencephalon
- Mesencephalon
- Rhombencephalon → Metencephalon + Myelencephalon veya Pons + Cerebellum + Bulbus

✓ Metencephalon → Pons + Cerebellum
✓ Myelencephalon → Bulbus

PSS
✓ Periferik sinir sistemi → Santral sinir sistemi ve çevre arasında iletişimi sağlar.
✓ Periferik sinir sistemi → Kraniyal sinirler, spinal sinirler ve otonom sinir sisteminden oluşur.
✓ Kraniyal sinir → Nöron gövdeleri beyinde bulunan aksonların oluşturduğu periferik sinirler.
✓ Spinal sinir → Nöron gövdeleri medulla spinalis'te bulunan aksonların oluşturduğu periferik sinirler.

SORUNUN ÖZÜ

N. mandibularis bloğunda etkilenmeyen sinir

ANAHTAR KELİME

N. mandibularis

DOĞRU CEVAP

✓ **N. infraorbitalis (n. maxillaris dalı)**

BİLGİ

N. infraorbitalis n. maxillaris'in terminal dalıdır. N. lingualis, N. buccalis, N. alveolaris inferior, N. auriculotemporalis; N. mandibularis'in dallarıdır.



KİTAPTAKİ KARŞILIĞI

DUS Anatomi Konu Kitabı

Sayfa 77

BÖLÜM 4 Nöroanatomi

N. maxillaris

Sinus cavernosus'tan, for. rotundum'dan, fossa pterygopalatina'dan[T] ve fissura orbitalis inferior'dan geçer.
Alt göz kapakları, üst dudak derisi, nasopharynx, tonsilla palatina, palatum, üst çene ve diş etlerinden duyu alır.

- ✓ N. infraorbitalis[D] → Terminal dalı. Alt göz kapağı, üst dudak ve burundan duyu alır.
- ✓ R. meningeus → Dura mater
- ✓ R. ganglionares → Gang. pterygopalatinum
- ✓ N. zygomaticus → Fissura orbitalis inferior'dan geçer.
- ✓ R. alveolaris superior medius, superior anterior ve posterior → Sinus maxillaris[D] ve üst dişlerin duyusu.

N. mandibularis

For. ovale'den[D] geçerek fossa infratemporalis'e gelir.

- ! M. temporalis ! M. masseter[TD]
- ! M. pterygoideus medialis - lateralis
- ! M. tensor tympani[D] ! M. tensor veli palatini[T]
- ! M. digastricus venter anterior[T]
- ! M. mylohyoideus'u innerve eder.

N. pterygoideus medialis ve r. meningeus dallarını verdikten sonra

- ✓ Truncus anterior: N. massetericus - N. buccalis
  N. pterygoideus lateralis - N. temporales profundi
- ✓ Truncus posterior: N. auriculotemporalis - N. lingualis - N. alveolaris inferior