


FA MİKROBİYOLOJİ DUS KONU KİTABI 5.BASKI GÜNCELLEME NOTLARI



MERHABA ARKADAŞLAR BU PDF SİZLERE OLAN SORUMLULUĞUMUZ GEREĞİNCE
YENİ ÇIKAN 5.BASKIMIZ İLE 4.BASKI NOTUMUZ ARASINDAKİ FARKLARI İÇERMEKTEDİR
(ÖZELLİKLE MURRAY 2025 GÜNCELLENMELERİNİ İÇERİR).
ELİMİZDEN GELDİĞİNCE GÜNCELLENEN KISIMLARI
NOTUMUZA KOYMAYA GAYRET ETTİK. ÇALIŞMALARINIZDA FAYDALI OLMASI DİLEĞİYLE
BU VESİLEYLE YAYINLARIMIZA, KİTAPLARIMIZA GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİ İÇİN BİR KEZ
DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

FEYYAZ AKAY MD
Instagram, Telegram: feyyazakaymd
YouTube: Feyyaz AKAY
www.dusakademisi.com

WWW.DUSAKADEMISI.COM

Sayfa: 25 Antimikrobiyallere aşağıdaki bilgiler ilave edildi:

Metronidazol: Anaeroblar, Giardia, E.histolytica, T.vaginalis tedavisinde verilir.
Sülfonamidler: Enterokoklar doğal dirençli, Riketsiyaların üremesini artırır.

Sayfa: 49

Stafilokok: Küme şeklinde gr + kok ilave edildi.

Sayfa 56

B.anthraxis tedavisi kısmında Siprofloksasin önerilir (profilaksi ve ampirik tedavide) ilave edildi.

Sayfa 70 Gonokok tanı kısmı aşağıdaki şekilde güncellendi:

Tanı: PCR (Gold standart; Antibiyotik duyarlılığı yapılamaz)

Semptomatik erkekte gram boyamanın sensitivitesi ve spesifitesi yüksek; fakat asemptomatik erkekte sensitivite düşük. Semptomatik ya da asemptomatik kadında servisini saptamada sensitivitesi düşük.

Kadında ve asemptomatik erkekte negatif gelen gram boyama sonuçları kültür ya da PCR (NAAT) ile doğrulanmalıdır.

*Gonokoklar'ın ışığa hassas olmaları nedeniyle, kültür için ekimleri hasta başında yapılmalı ve yapılan ekimler karbon kağıdına sararak saklanmalıdır.

Sayfa 75 V.cholera tedavi kısmı aşağıdaki şekilde güncellendi:

- Sıvı elektrolit replasmanı yapılmalıdır (esas tedavi).
- Erişkin ve çocukta tek doz Azitromisin verilir (Gebe olmayan erişkinde alternatifleri tek doz Doksisisiklin ya da Siprofloksasin)
- Canlı ve ölü aşısı bulunur.

Sayfa 95

Virüsler ve bağlandıkları reseptörler tablosunda HBV reseptörü NTCP olarak değiştirildi.

Sayfa 130

Antifungaller kısmına aşağıdaki bilgi ilave edildi

* T.indotineae: S.epoksidaz mutasyonu ile Terbinafin direnci

Sayfa 137 Candida bölümü aşağıdaki şekilde değiştirildi:

Candida santral venöz katetere bağlı kan dolaşımı enfeksiyonlarında 1. sıradadır.

Sayfa 138 Candida parapsilosis kısmı aşağıdaki şekilde güncellendi:

- * Kateterle ilişkili fungemiye neden olabilir.
- * Dev hücreler oluşturması tipik özelliğidir.

Sayfa 142 P.jirovecii' ye aşağıdaki bilgi ilave edildi:

Beta-glukan testi: Pnömosistis pnömonisi hızlı tanısında yüksek sensitivite ve spesifiteli test

Sayfa 145 E.histolytica giriş kısmı aşağıdaki şekilde güncellendi:

E.histolytica ve kommensal türler olan E.dispar, E.moshocskii, E.bangladeshi, E.nuttalli birbirlerinden morfolojik olarak ayırt edilemezler.

Sayfa 146 Aşağıdaki şekilde güncellendi:

METAMONADA (FLAGELLALI) PARAZİTLER (GIARDIA, TRICHOMONAS, DIENTAMOEBİ)

Dientamoeba fragilis (trofozoid; insanda nadir kist tespit edildi, rolü bilinmiyor)

Sayfa 148 aşağıdaki bilgi ilave edildi:

Apicomplexa (Sporozoonlar): Cryptosporidium, Cyclospora, Cystoisospora, Sarcocystis, Toxoplasma, Babesia, Plasmodium

Sayfa 150 Plasmodium bölümüne aşağıdaki bilgiler ilave edildi:

Plasmodium vivax/ ovale: Benign tersiyer sıtma

Plasmodium malaria: Kuartan sıtma

Plasmodium falciparum: Malign tersiyer sıtma

Plasmodium knowlesi: Simian malarya, Quotidian malarya

Hiperparazitemi:

P.falciparum ve P.knowlesi

Fark: Periferik yaymada P.falciparum' da erken formlar görülür (genç halka formları ve gametositler).

Sayfa 156 D.latum' un ismine Diphyllbothriocephalus latus de ilave edildi (yeni olarak daha çok kullanılan adı)

Sayfa 147 Giardia Giardia duodenalis (G.lamblia, G.intestinalis) başlığına alındı