

- ANATOMİ SORU KAMPI 13/13

ANATOMİ

Konu kitabı sayfa: 30, Soru kitabı sayfa 50/7.soru, Soru kampı 59.soru

2026
AĞUSTOS
TUS ÇIKMIŞ
SORU

Başın rotasyonu hakkındaki soru

59

Hangisi, belli bir seviyeden sonra isim değiştiren ligamentlerden biridir?

- A) lig.denticulatum m.Spinalis stabilizasyonu, pila ve dura arasında
B) lig.longitudinale post. Membrana tectoria → Lig.longitudinale post.'un C2 sonrası yukarı uzanan parçasının adı
C) lig.interspinale
D) lig.apicis dentis Notokord artığı
E) lig.alaris Rotasyon kontrolü

Lig.nuchae → Lig. supraspinale'nin C7 sonrası yukarı uzanan parçasının adı olup, başın hiperflexiyonunu önler.

Membrana atlantooccipitalis post.'u delen:

-a.vertebralis
-n.suboccipitalis

Dr. Özgür Öz

tip
akademisi


T*00,03,06,10,14
benzeri

2.Art.atlantoaxialis mediana

- Atlas - dens axis arasında
- Trochoid
- Başın rotasyonu
- Ligamentleri:

- Lig.alaria → Rotasyon kontrolü
- Lig.apicis dentis → Notokord artığı
- Lig.cruciformis (Lig.transversum atlantis + fasciculi long. sup & inf.)
- Lig.transversum atlantis → Dens axis stabilizasyonu
- Membrana tectoria → Lig.longitudinale post.'un C2 sonrası yukarı uzanan parçasının adı

3.Art.atlantoaxialis lateralis



7- Art.atlantoaxialis mediana'ya ait ligamentlerden hangisi dens axis stabilizasyonundan sorumludur?

- A) Lig.alaria
B) Lig.apicis dentis
C) Lig.cruciformis
D) Lig.transversum atlantis
E) Membrana tectoria

- Lig.transversum atlantis → Dens axis stabilizasyonu
- Lig.alaria → Rotasyon kontrolü
- Lig.apicis dentis → Notokord artığıdır. Dens axis'in tepesi ve for.magnum ön kenarı arasında uzanır.

Cevap:7D



2026
AĞUSTOS
TUS ÇIKMIŞ
SORU

Eldeki extansor kompartman hakkındaki soru


- C) M.pronator teres'in ulnar başının altındaki n.interosseus anterior
D) M.supinatorius'un altındaki n. interosseus posterior
E) Aponeurosis bicipitalis'in altında n.medianus

35- Retinaculum extensorum'un 6.kanalından geçen oluşum, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

- A) M.extensor carpi ulnaris
B) M.extensor digiti minimi
C) M.extensor pollicis longus
D) M.extensor carpi radialis brevis
E) M.abductor pollicis longus

36- Sağ el bileğinde ağrısı olan 43 yaşında kadın hasta, ağrının ön kol ve el başparmağına doğru yayıldığını ifade ediyor. FM'de yumruk sıkma hareketi sırasında mevcut ağrı ön kol radial tarafa fıkse oluyor.Extansor tenosinoviti olduğu düşünülen hastada, lezyon hangi tendonda olabilir?

- A) M.extensor carpi radialis
B) M.extensor digiti minimi
C) M.extensor pollicis brevis
D) M.extensor indicis
E) M.extensor pollicis longus




EXTANSOR COMPARTMENT: retinaculum extensorum altından extansor kas tendonlarının geçtiği 6 kanal bulunur.

- 1: m.extensor poll.brevis, m.abd. pollicis longus
2: m.extensor carpi radialis brevis, m.extensor carpi radialis longus
3: m.ext. pollicis longus
4: m.extensor digitorum
5: m.ext. digiti minimi
6: m.ext. carpi ulnaris

De Quervain tenosinoviti → m.extensor pollicis brevis ve m.abductor pollicis longus tendonlarını saran tendinöz kılıfın kalınlaşmasıyla oluşan 1.osseofibroz tünelin darlığıdır. El bileğinde ağrı mevcut olup, ağrı ön kol ve el başparmağına yayılır.yumruk sıkma ya da cisim kaldırma sırasında ön kol radial taraftaki ağrı ile karakterizedir.

Cevap:35A,36C

Konu kitabı sayfa: 40, Soru kitabı sayfa 69/35-36.soru



TOPOGRAFİK KORELASYON:

- m.coracobrachialis'i delen sinir: N.MUSCULOCUTANEUS

TOPOGRAFİK KORELASYON:

- Aponeurosis bicipitalis ÖNÜNDEN → v.mediana cubiti
Aponeurosis bicipitalis ARKASINDAN → a.brachialis, n.medianus

TOPOGRAFİK KORELASYON:

- m.supinator'u delen sinir → N.RADIALIS
connexus intertendinosus → m.extensor digitorum'a aittir.

EXTANSOR COMPARTMENT: retinaculum extensorum altından extansor kas tendonlarının geçtiği 6 kanal bulunur.

- 1: m.extensor poll.brevis, m.abd. pollicis longus
2: m.extensor carpi radialis brevis, m.extensor carpi radialis longus
3: m.ext. pollicis longus
4: m.extensor digitorum
5: m.ext. digiti minimi
6: m.ext. carpi ulnaris

ANATOMİ

2026
AĞUSTOS
TUS ÇIKMIŞ
SORU

Konu kitabı sayfa: 60, Soru kitabı sayfa 94/15-16-17.soru,
Soru kampı 131.soru

Sağ atrium hakkındaki soru

DOLANIM SİSTEMİ

131


Aşağıdakilerden hangisi, sağ atrium'da bulunmaz?

- A) crista terminalis
- B) m. pectinati
- C) tricuspid kapak
- D) coroner sinus
- E) m. papillaris

Sağ atrium'da bulunan oluşumlar:

- ostium VCS
- ostium VCI ve valvula v.cava inferioris
- fossa ovalis / limbus fossa ovalis
- ostium sinus coronarius (kalbin venöz kanını toplar.)
- foramina venarum minimarii
- torus intervenosus (VCS ve VCI arasında)
- sulcus terminalis (dış yüzde) / crista terminalis (iç yüzde)
- ✓ crista terminalis üst ucunda: SAN
- CRISTA TERMINALIS ÖNÜ: ATRIUM PROPER / arkası: ostium venarum cavarum
- mm. pectinati

Dr. Öğlen Öz
T*87,91,97,02,10,15,
17 benzeri




Atrium Dextrum:

Sağ atrium'da bulunan oluşumlar:

- ostium VCS (kapak yok)
- ostium VCI ve valvula v.cava inferioris
- fossa ovalis / limbus fossa ovalis
- ostium sinus coronarius (kalbin venöz kanını toplar.)
- foramina venarum minimarii
- torus intervenosus (VCS ve VCI arasında)
- sulcus terminalis (dış yüzde) / crista terminalis (iç yüzde)
- ✓ crista terminalis üst ucunda: SAN
- crista terminalis önü: atrium proper / arkası: ostium venarum cavarum
- mm. pectinati

- Sağ atrium'a açılanlar: VCS
VCI
sinus coronarius
v. cardiaca anteriores
v. cardiaca minimae (Thebesian venleri)



Sağ atrium'daki önemli oluşumlar:

- ostium sinus coronarius (kalbin venöz kanını toplar.)
- torus intervenosus (VCS ve VCI arasında)
- sulcus terminalis (dış yüzde) / crista terminalis (iç yüzde)
- crista terminalis önü: atrium proper / arkası: ostium venarum cavarum


Sinus venarum cavarum ve atrium proper arası sınır: Crista terminalis

✓ Sağ atrium'da düz olan arka parça: Sinus venarum cavarum

✓ Sağ atrium'da pürüklü olan ön parça: Atrium proper

✓ Crista terminalis üst ucunda: SAN bulunur. Crista terminalis, SA ve AV düğümleri arasında posterior internodal yolun (Thorel) rehberidir. Cevap: 15E, 16B, 17B

ATRIUM DEXTRUM



Konu kitabı sayfa: 56-57, Soru kitabı sayfa 83, Soru kampı117.soru

**2026
AĞUSTOS
TUS ÇIKMIŞ
SORU**

Larynx kıkırdakları hakkındaki soru

E) Cartilago cuneiformis

bulunur. Cevap:13B,14A

15- Ventriculus laryngis hangi iki anatomik yapı arasında bulunur?

- A) Plica vocalis-cartilago cricoidea
B) Plica vocalis- plica vestibularis
C) Aditus laryngis-plica vestibularis
D) Plica aryepiglottica- plica glossoepiglottica lateralis
E) Plica vocalis- plica vocalis

16. Larynx ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
(T* benzeri)

- A) Larynx boşluğunun en dar yeri, rima glottidis'dir.
B) Rima vestibuli, 2 lig. vestibulare arasındadır.
C) Membrana thyrohyoidea'yı delen oluşum, n.laryngeus superior amatus'tur.
D) Ventriculus laryngis, plica vestibularis ve plica vocalis arasındadır.
E) Membrana quadriangularis'in alt kenarı, plica vocalis'tir.

17- Linea obliqua'ya tutunan kas, aşağıdakilerden hangisidir?

- A) *M.sternothyroideus*
B) *M.aryepiglottica*
C) *M.cricothyroideus post.*
D) *M.thyroarytheneus*
E) *M.cricothyroideus*

• **Membrana quadrangularis:** Ventriculus laryngis üstünde bulunur. Kalın ve sağlam alt kenarına **liq.vestibulare** denir.

- ✳ **Lig. vestibulare**, önde thyroid arkada arytеноid'e tutunur. ✳
 - ✳ **Membrana triangularis** (Conus elasticus / membrana cricovocalis): üst kenarına **lig. vocale** denir. ✳
 - ✳ **Rima glottidis** (mizmar aralığı) → **proc. vocalis**'ler arası bölüm
- Cevap: 15B, 16E

Cevap:15B,16E


• *Linea obliqua*'ya tutunan kaslar:
m.thyrohyoideus, m.sternothyroideus, m.constrictor paryngis inf.

Cevap:17A

117 T*00,21 benzeri

Conus elasticus'un üst ucu aşağıdakilerden hangisi tarafından oluşturulur?

- ☒ B) Plica vocale




ANATOMİ

2026
AĞUSTOS
TUS ÇIKMIŞ
SORU

Trigonum caroticum hakkındaki soru

Konu kitabı sayfa: 52, Soru kitabı sayfa 56/22.soru ve 99. sayfa 5.soru, Soru kampı 80.soru



3. TRIGONUM CAROTICUM:

Sınırları:
lateral: m. SCM
medial: m. omohyoideus venter sup.
üst: m. digastricus venter post.

İçindekiler: a. carotis comm.
ACE (a. facialis, a. lingualis, a. thyroidea sup., a. occipitalis, a. pharyngea asc.,)
ACI
v. jugularis interna, CN 10-11-12 derin cervical LN

5. TRIGONUM OCCIPITALE:

Sınırları:
m. SCM, m. omohyoideus venter inf., m. trapezius

4. TRIGONUM MUSCULARE (OMOTRACHEALE):

Sınırları:
alt lateral: m. SCM
medial: boyun orta hattı
üst lateral: m. omohyoideus venter sup.
İçindekiler: gl. thyroidea, gl. parotidea infrahyoid kaslar larynx, trachea

6. TRIGONUM SUPRACLAVICULARE (OMOCLAVICULARE):


Sınırları:
alt: clavicula
medial: m. SCM

5. A. carotis externa ve dalları'nı dıştan çaprazlayan sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) N. pharyngeus ascendens
- B) N. lingualis
- C) N. accessorius pars spinalis
- D) N. vagus
- E) N. hypoglossus

A. carotis externa ve dalları'nı dıştan çaprazlayan: N. hypoglossus (CN12)

Cevap: 5E



22. Boyun üçgenleri ve içindeki anatomik oluşumları ile ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (T* benzeri)

- A) A. subclavia, trigonum omooclaviculare'de bulunur.
- B) V. jugularis anterior'un başlangıcı, trigonumsubmentale'de bulunur.
- C) N. accessorius, trigonum occipitale'de bulunur.
- D) Plexus brachialis'in fasciculusları, trigonum occipitale'de bulunur.
- E) Gl. thyroidea, trigonum omotracheale'de bulunur.

A. vertebralis, trigonum suboccipitale'de yer alır.
Ancak trigonum suboccipitale boyun üçgeni değildir.

Cevap: 22D

80

Hangisi trigonum caroticum içinde yer alan oluşumlardan biri değildir?

- A) v. jugularis externa
- B) ACE
- C) ACI
- D) VII
- E) derin cervical LN

T*95,07,10,11,16,
17 benzeri


Trigonum supraclaviculare (omooclaviculare)

TRIGONUM CAROTICUM:

Sınırları:
lateral: m. SCM
medial: m. omohyoideus venter sup.
üst: m. digastricus venter post.
İçindekiler: a. carotis comm.
ACE (a. facialis, a. lingualis, a. thyroidea sup., a. occipitalis, a. pharyngea asc.,)
ACI
v. jugularis interna, CN 10-11-12 derin cervical LN

Dr. Özgür Özgür

tip
akademisi



2026
AĞUSTOS
TUS ÇIKMIŞ
SORU

Pelvis kasları hakkındaki soru

Konu kitabı sayfa: 50, Soru kitabı sayfa 78/8. soru ve
sayfa 79/11. soru, Soru kampı 112. soru

11- Diaphragma pelvis'i yapan esas kas, aşağıdakilerden hangisidir? (T* benzeri)

- A) M. levator ani
- B) M. bulbospongiosus
- C) M. ischiocavernosus
- D) M. obturatorius internus
- E) Corpus perineale

*Diaphragma pelvis'i yapan kaslar: M. levator ani & M. coccygeus
Cevap: 11A

8- Aşağıdakilerden hangisi fossa ischioanalisin dış duvarında yer alır? (T* benzeri)

- A) M. sphincter ani externus
- B) N. pudendus
- C) M. levator ani
- D) M. coccygeus
- E) Rectum

*Fossa ischioanal:

- Lateralde: Tuber ischiadicum, m. obturatorius internus ve fascia obturatoria

*Canalis pudendalis (Alcock kanalı, a.v. pudenda interna, n. pudendus) lateral duvarda olup m. obturatorius internus ve fascia obturatoria arasında yer alır.

- Medialde: M. sphincter ani externus ve m. levator ani

- Arkada: M. gluteus maximus ve lig. sacrotuberale

- Önde (apex): Derin perine aralığına uzanır.

Cevap: 8B

FOSSA ISCHIOANALIS (ISCHIORECTALIS)

- Canalis analis'in her iki tarafında

Önde derin perine aralığına (diaphragma urogenitale) uzanır.

Sınırları:

Dışta: Tuber ischiadicum, m. obturatorius internus'un alt parçası ve canalis pudendalis (Alcock kanalı)


İçte: M. levator ani ve m. sphincter ani externus

Arkada: Lig. sacrotuberale ve m. gluteus maximus

Önde (apeksi): m. transversus perinei profundus ve m. sphincter urethrae externus

Tabanı: Deri ve faysa

İçindekiler: Yağ-bağ dokusu, v.a.n. rectalis inferior'lar, S2-S4'ün dalları.



50

112

38 yaşındaki erkek hasta, perianal bölgede ağrı ve ateş şikâyetiyle başvuruyor.

Muayenede ischioanal (ischioanal) fossada apse saptanıyor. Cerrahi drenaj planlanırken, apsenin fossa duvarında seyreden önemli nörovasküler yapılarla ilişkisi değerlendiriliyor. Aşağıdaki yapılardan hangisi fossa ischioanalın lateral duvarında

Bulunan pudendal kanal (Alcock kanalı)

içerisinde yer alarak fossa duvarına katılır?

- A) a. pudenda interna
- B) m. piriformis
- C) m. iliococcygeus
- D) m. puborectalis
- E) m. levator prostatae

Dr. Öğlen Öz

tip
akademisi

T*00,20 benzeri

İchioanal (ischioanal) fossa:

Anal kanalın iki yanında bulunan yağ dokusuyla dolu boşluktur.

Anal apselerin ve fistüllerin sık görüldüğü bölgedir.

M. iliococcygeus ve M. puborectalis

Bunlar levator ani'nin parçalarıdır ve fossanın:

medial duvarını oluştururlar.

M. piriformis

Pelvisin posterior duvarında bulunur, ischioanal fossa duvarında yer almaz.

Lateral Duvar

M. obturatorius internus

Fascia obturatoria

Canalis pudendalis (Alcock kanalı)

Bu kanal içerisinde:

A. pudenda interna V. pudenda interna N. pudendus

seyreder.

ANATOMİ

Konu kitabı sayfa: 16, Soru kitabı sayfa 26/10. soru,
Soru kampı 32-33-38-48.soru

2026
AĞUSTOS
TUS ÇIKMIŞ
SORU

Sphenoid kemik hakkındaki soru

OS SPHENOIDALE

Tüm nörocranium kemikleri ile eklemleri:

Fossa cranii media tabanındaki kemiktir.

Os sphenoidale'deki önemli oluşumlar:

• Ala Minor

Canalis opticus → CN 2 (n. opticus)

a. ophthalmica

a. centralis retinae

Sulcus prechiasmaticus → Chiasma opticum

• Ala Major

For. rotundum → CN 5/2 (n. maxillaris)

For. ovale → CN 5/3 (n. mandibularis)

n. PETROSUS MINOR (CN 9 PS dalı, parotis inn.)

For. spinosum → a. meningea media

• Ala major ve ala minor arası açıklık → Fissura orbitalis sup.

• Carpus

Sella turcica: dorsum sellae (proc. clinoideus post.) arkada

tuberculum sellae (proc. clinoideus medius) önde

Fossa hypophysialis arada → hipofiz bezi

• Sulcus caroticus (a. carotis interna)

Fissura orbitalis inf. → maxilla ve os sphenoidale arasındaki açıklık

etablaya fossa pterygopalatina'ya bağlıdır.

CNS/2 dallanır.

• Proc. pterygoideus (fossa scaphoidea)

Canalis pterygoideus (n. canalis pterygoideus n. viduiz)

n. viduiz → n. petrosus major → n. petrosus profundus

SINUS CAVERNOSUS'tan geçenler (OTOMA):

• CN 3 (n. oculomotorius)

• CN 4 (n. trochlearis)

• CN 5/1 (n. ophthalmicus)

• CN 5/2 (n. maxillaris)

• CN 6 (n. abducens) → içinden geçer.

• A. carotis interna → içinden geçer.

(a. hypophysialis inferior dalı)

OTOM → devam bulur.

FISSURA ORBITALIS SUP.'dan geçenler:

• CN 3 (n. oculomotorius)

• CN 4 (n. trochlearis)

• CN 5/1 (n. ophthalmicus)

• CN 6 (n. abducens)

• Ophthalmica'lar

KLINİK KORELASYON:

• PTERION: Os sphenoidale ala major, os parietale, os frontale ve os temporale birleşiminde

Kafanın en zayıf bölgesidir.

Perion altından geçen: A. meningea media




Perion dalı travma → Epidural kanama, a. meningea media hasarı

Hipofiz bezi cerrahisinde transsüal / transsphenoidal yol ile girişim yapılır.

Hipofiz tümöründen en sık etkilenen sinir: CN2

Hipofiz bezi, sinus cavernosus ile yakın kompartımda

Sinus cavernosus trombozunda ile etkilenen sinir, içinden geçen CN6'dır.



32

Yüzün alt kısmında duyu kaybı ve çiğneme kaslarında güçsüzlük gelişen bir hastanın kraniyal MR incelemesinde, sphenoid kemiğin büyük kanadındaki bir foramen, tutan tümör saptanıyor.

Bu tümörün geçtiği foramenin aşağıdaki yapılardan hangisi normalde geçmektedir?

- A) N. opticus
- B) N. maxillaris
- C) N. petrosus minor
- D) A. meningea media
- E) A. carotis interna

Dr. Özgür Ög

tip akademisi

Hastadaki bulgular:

Alt yüz duyusu ↓

Çiğneme kasları zayıf → N.

mandibularis (V3) etkilenmiştir.

N. mandibularis'in kafatasını terk ettiği delik:

Foramen ovale

FOR. ROTUNDUM:

CN 5/2 (n. maxillaris)

FOR. O VALE:

CN 5/3 (n. mandibularis) n. PETROSUS

MINOR

(CN9 PS dalı, parotis inn.)

FOR. SPINOSUM:

a. meningea media

33

Aşağıdakilerden hangisi, fissura orbitalis superior'dan geçer?

- A) n. opticus
- B) n. mandibularis
- C) n. petrosus minor
- D) a. meningea media
- E) abducens

Dr. Özgür Ög

tip akademisi

T*94,04,06 benzeri

Fissura orbitalis sup.'dan

geçenler:

CN 3 (n. oculomotorius)

CN 4 (n. trochlearis)

CN 5/1 (n. ophthalmicus)

CN 6

V. ophthalmica'lar

Sinus cavernosus'tan geçenler (OTOMA):

CN 3 (n. oculomotorius)

CN 4 (n. trochlearis)

CN 5/1 (n. ophthalmicus)

CN 5/2 (n. maxillaris)

CN 6 (n. abducens) → içinden geçer.

A. carotis interna → içinden geçer.

(a. hypophysialis inferior dalı)

48

Aşağıdakilerden hangisi, fossa cranii media'da yer alan bir oluşum değildir?

- A) meatus acusticus internus
- B) gang. trigeminale
- C) for. lacerum
- D) tegmen tympani
- E) sulcus caroticus

Dr. Özgür Ög

tip akademisi

Canalis opticus → CN2

a. ophthalmica

a. centralis retina

Fissura orbitalis sup. → CN3, 4, 5/1, 6

v. ophthalmica

Sulcus caroticus → ACI

For. rotundum → CNS/2

For. ovale → CN5/3, n. petrosus minor

For. spinosum → a. meningea media

Tuberculum sellae, Fossa hypophysialis, Dorsum sella

Sinus cavernosus

Sulcus caroticus

Tegmen tympani, Impressio trigeminale


Gang. trigeminale

For. lacerum

E) Klippel-Feil sendromu

10 Aşağıdakilerden hangisi, os sphenoidale'ye ait bir oluşum değildir? (T* benzeri)

- A) Canalis opticus
- B) Canalis caroticus
- C) Sulcus caroticus
- D) Canalis pterygoideus
- E) Fissura orbitalis superior



Canalis caroticus → os temporalis'e ait (a. carotis int. geçer)

Canalis caroticus, orta kulak kavitesinin ön duvarındadır.

Sulcus caroticus (a. carotis interna) os sphenoidale'ye aittir.

Cevap:10B

Omentum minus


Karaciğeri örten peritonun duodenuma (lig. hepatoduodenale) ve mideye (lig. hepatogastricum) atarken oluşturduğu yapı.

Lig. hepatoduodenale

- ✓ V. porta hepatis
- ✓ A. hepatica propria^T
- ✓ Ductus choledochus + Lenf + Sinir

Lig. hepatogastricum

- A.v. gastrica sinistra - dextra
- N. vagus gastrik dalları
- Sol gastrik lenf düğümleri



201

ANATOMİ > Sindirim > Periton

2026 Ağustos TUS ANATOMİ Soru Kampı

22

Lig. hepatoduodenale

I-) V. porta hepatis

II-) N. vagus'un gastrik dalları

III-) A. hepatica propria

IV-) Ductus choledochus

V-) A.v. gastrica sinistra - dextra

Hangileri lig. hepatoduodenale içerisinde bulunur?

A) I-II-III

B) I-III-IV

C) II-V

D) I-III

E) III-IV-V

Lig. hepatoduodenale


Lig. hepatogastricum

Lig. hepatoduodenale

Lig. hepatoduodenale

Lig. hepatogastricum

Karaciğer ameliyatı kanama kontrolü




Subaraknoid aralık en alt seviye

Zarları

- ! Pia mater spinalis, L1-L2 arası discus'ta kapanır.
- ! Dura mater spinalis ve arachnoidea mater spinalis S2'de kapanır.

Beslenmesi^T

- ✓ A. spinalis **anterior** dalı ön 2/3'ünü,
- ✓ A. spinalis **posterior** dalı arka 1/3'ünü besler.
- A. subclavia, a. iliaca interna, aorta thoracica ve aorta lumbalis'in dalları besler.
- Spinal (segmental) arterler, a. radicularis anterior ve posterior dallarına ayrılır.
- ! A. radicularis magna (Adamkiewicz): A. radicularis anterior'ların en büyüğü.
- ! Lumbal medulla spinalisi besleyen en önemli arter.



ANATOMİ > Nöroanatomi > Giriş



2026 Ağustos TUS ANATOMİ Soru Kampı

79

Medulla spinalis ile ilgili hangisi yanlıştır?

- A) For. magnum ile L1-L2 arası discus intervertebralis arasında uzanır.
- ☒ B) Lig. denticulatum, medulla spinalis'i vertebra corpusuna tutturur.
- C) L1 seviyesinin altında radix anterior ve posterior'lar *cauda equina*'yı oluşturur.
- D) Alt **motor** nöronlar cornu antierius'ta, **duyu** nöronları cornu posterius'ta bulunur.
- E) Cornu laterale yapısı **T1- L2** ve **S2-S4** arasında bulunur.

Filum terminale **internum**, **conus medullaris** ile S2 arasında uzanır. **Pia** mater uzantısı
Filum terminale **externum**, **S2** ile Co1 arasında uzanır. **Dura** mater uzantısı



ANATOMİ

2026
AĞUSTOS
TUS ÇIKMIŞ
SORU

Crista urethralis → Arka duvarda bulunan mukoza kabartısı.

Sinus prostaticus → Crista urethralis'in iki yanında. Ductuli prostatici açılır.

! Colliculus seminalis (Verumontanum) → Crista urethralis'in ortasındaki kabartı




ANATOMİ > Genitoüriner > Üretra

2026 Ağustos TUS ANATOMİ Soru Kampı

56

Ductuli prostatici nereye açılır?

- A) Crista urethralis Arka duvarda bulunan mukoza kabartısı
- B) Sinus prostaticus** Crista urethralis'in her iki yanında bulunur
- C) Colliculus seminalis Verumontanum Crista urethralis'in ortasındaki kabartı
- D) Utriculus prostaticus Kabartının ortasındaki çıkmaz Ductus ejaculatorius açılır
- E) Fossa navicularis Üretra'nın glans penis içerisinde genişlemesi



Prostat kanalları


2026
AĞUSTOS
TUS ÇIKMIŞ
SORU

Tonsilla palatina beslenmesi

Tonsilla **palatina**'yı besleyen arterler^D


- ✓ A. facialis'in → R. **tonsillaris** ve A. palatina ascendens dali
- ✓ A. palatina descendens'in devamı → A. palatina major
- ✓ A. lingualis'in → A. dorsalis lingua dali
- ✓ A. carotis externa'nın → A. pharyngea ascendens dali

✗ Duyusu → N. glossopharyngeus'un n. tympanicus ve r. tonsillares
N. maxillaris'in n. palatini minores dalları alır.



Tonsillektomi'de en sık yaralanan

- ! Arter → A. **facialis**^T
- ! Ven → V. **palatina externa**
- ! Sinir → N. **glossopharyngeus**^D



ANATOMİ > Sindirim > Pharynx

Tonsillektomi sırasında **en sık** yaralanan arter?

- A) A. palatina ascendens
- B) A. palatina descendens
- C) A. pharyngea ascendens
- D) A. facialis**
- E) A. maxillaris

Tonsillektomi sırasında **en sık** kanayan ven?



V. **palatina externa** V. facialis'e dökülür

Tonsillektomi sırasında **en sık** yaralanan sinir?


N. **glossopharyngeus** (Tonsilla palatina innervasyonu)

2026 Ağustos TUS ANATOMİ Soru Kampı

13






ANATOMİ



Fındıkkıran Sendromu

İra duodenojejunalis arasında uzanır.
/er alır.
de 9. kıkırdak kaburga seviyesi
psaos major



ANATOMİ > Sindirim > Duodenum

Radix mesenterii aşağıdaki yapılardan hangisini önden çaprazlamaz?


- A) Pars horizontalis duodeni Ön komşusu
- B) Aorta abdominalis V. cava inferior
- C) Sağ üreter
- D) Sağ psaos major
- E) A.v. mesenterica superior**

Duodenum pars horizontalis'in ön komşuları

2026 Ağustos TUS ANATOMİ Soru Kampı

31

Radix mesenterii önden çaprazladığı yapılar
► Pars horizontalis duodeni
► Aorta abdominalis ► V. cava inferior
► Sağ üreter ► Sağ psaos major



ANATOMİ

2026
AĞUSTOS
TUS ÇIKMIŞ
SORU

N. genitofemoralis (L1-L2)^T → M. psoas major'u deler.

✓ R. **genitalis** → Canalis inguinalis'e girer. Üreter ve a.v. testicularis (ovarica)'yı çaprazlar. M. cremaster ve m. dartos'u uyarır.

✓ Canalis inguinalis'ten çıkınca mons pubis ve labium majus pudendi etrafında^Y dağılır.

✓ R. **femoralis** → Trigonum femorale'nin deri duyusunu alır.

! Kremaster refleksinin Afferenti → R. **femoralis** ve N. ilioinguinalis | Efferenti → N. **genitalis**

ANATOMİ > Nöroanatomi > Plexus'lar

2026 Ağustos TUS ANATOMİ Soru Kampı

171

Aşağıdakilerden hangisi canalis inguinalis içerisinden geçer?

MOİA – MTA arasında

A) N. iliohypogastricus M. quadratus lumborum'un önünden

McBurney noktasına yapılan kesi

B) N. ilioinguinalis Scrotum / Suprapubik / Uyluk üst-iç

C) N. obturatorius **Uyluk** medialinden deri duyusu. Bacaktan değil!

D) N. genitofemoralis r. femoralis Trigonum femorale duyusu

R. **genitalis** Üreter ve a.v. ovarica'yı çaprazlar

Cremaster refleksinin Afferent ve Efferenti

E) N. cutaneus femoris lateralis

Caecum ile m. iliacus arasında

SIAS ile lig. inguinale arasında

Arkasından


Meralgia parestetica

MTA
MOİA
MOEA

Anulus inguinalis profundus
Fascia abdominalis
superficialis

M. obliquus externus abdominis
aponörozu ve lig. inguinale

A.v. femoralis



Labium majus ve
Uyluk ön üst yüz