

Sayfa no	Soru	Düzentilmiş hali
33	17	Soru kökünün: "Aşağıdakilerden hangisi protein çöktirmeden dentin tübüllerini tıkayarak dentin hassasiyetini giderir?" olarak güncellenmesi uygundur. Açıklamadaki protein çökticilerin aynı zamanda dentin tübüllerini tıkadığı bilinmelidir.
41	26	Cevap: D
43		İg G ve İg M fagositozu artırır. "Laktoferrin aglutinasyon yapar." ifadesi çıkarılmalıdır.
49	7	Plağın içerisinde %80 sıvı ve %20 katı madde vardır.
85	39	B şıkkı: Cam iyonomer siman ile benzer mekanizma ile flor salar. Açıklama: CİS'ten az flor salar.
85	40	A şıkkı ve açıklama: Poliakrilik asit smear tabakasını kaldırır ve dentin tübül tıkaçlarını kaldırmadan yüzeyi hazırlar.
85		RMCİS CİS'ten daha çok polimerizasyon büzülmesi gösterir.
86	41	C şıkkı: Kapalı sandviç tekniğinde kompomer
86	44	II öncül : Rezervuar özelliği oldukça azdır. Açıklama: Rezervuar özelliği CİS ve RMCİS kadar değildir.
87	45	Cevap: B
88	51	Soru ve açıklamadaki absorbsiyon ifadesinin adsorbsiyon olarak düzenlenmesi uygundur.
98	91	D şıkkı: Dentindeki hidrojen bağı yer değiştirir. Açıklama: Nemli ve demineralize edilmiş dentinde kolajen ve su arasında hidrojen bağı vardır. Bu sayede kolajenlerin esnekliği ve hareket kabiliyeti sağlanır. Ancak dentin kurutulduğunda bu bağlar yer değiştirir. Hidrojen bağları tekrardan kolajen lifler arasında oluşur.
101	100	Cevap: A
111	148	1- Soruda "c faktör hangisinde en düşük" olarak sorgulanmaktadır. E şıkkında verilen sınıf 6 kavitenin kasp tepesine açılan kavite olduğu kabul edilmiştir. Eğer sınıf 6 anterior kesici kenar tipi olarak verilseydi en düşük c faktöre sahip olacaktı. 2- Sorunun açıklamasındaki sınıf 4 kavitenin c faktör değerinin 0,5 olarak alınması uygundur.
113	158	Radyometre: Işınımı/ışık yoğunluğunu ölçer. Birimi: mW/cm ² 'dir. Klinikte kullanılan ışık cihazlarının verimliliği bu cihazlarla rutin olarak ölçülmelidir. Spektrofotometre: 1- Renk ölçümünde kullanılır. 2- Işık cihazlarının güç ve dalga boyu ölçümünde kullanılır.
114	161	Açıklama: Tip 1: TPO ve ivocerin Tip 2: PPD ve CQ
129	25	Karbopol: Beyazlatmada meydana gelen oksidasyonu genişletir, beyazlatmayı uzatır şeklinde alınmalıdır.